

Esempio di protocollo di vaccinazione cane (WSAVA, 2016)

Valenza vaccinale ▼	CUCCIOLLO ^B				20 settimane ^C	6-12 mesi ^D	ADULTO
	6 sett	9 sett	12 sett	16 sett			
Virus del cimurro ^A	●	●	●	●	TITOLAZIONE	●	Vaccinare non più spesso di ogni 3 anni ^E
Adenovirus canino-2 ^A	●	●	●	●		●	
Parvovirus canino-2 ^A	●	●	●	●		●	
Leptospira (tetravalente) ^F		●	●				Vaccinazione annuale
Rabbia			●				Annuale o triennale (leggi foglietto illustrativo) ^G
<i>B. bronchiseptica</i> + Virus Parainfluenza (IN, P/Os) ^H	IN. Singola dose a partire da 3 settimane. P. Due dosi a partire da 4 settimane, distanziate di 2/3 sett.						Vaccinazione annuale

Domenico Russo DVM, PhD

A. Valenze vaccinali CORE, andrebbero somministrate a tutti i cani.

B. Se si inizia il ciclo vaccinale cucciolo prima delle 8 settimane di età, si può adottare un ciclo a 4 dosi vaccinali (6-9-12-16 oppure 7-9-12-16 settimane). Importante finire a 16 settimane di età e non prima. Sono considerati validi intervalli tra i vaccini di 2-4 settimane.

C. All'età di 20 settimane, ossia 4 settimane dopo la chiusura del I ciclo di vaccinazione cucciolo, la titolazione anticorpale permette di valutare l'avvenuta immunizzazione verso le valenze CORE. Se il cucciolo è immunizzato, per le valenze CORE ci si può regolare da quel momento come se il cane fosse adulto.

D. La titolazione a 20 settimane di età rappresenta un importante passo avanti nella profilassi vaccinale, perché offre la possibilità di refertare l'avvenuta immunizzazione. Tuttavia, laddove non lo consentissero circostanze varie, il suggerimento è di richiamare le valenze core a partire dai 6 mesi di età, per immunizzare quei cuccioli che avevano ancora anticorpi materni interferenti all'ultima dose vaccinale.

E. In alternativa alla vaccinazione triennale alla 'cieca', si può titolare triennialmente (eventualmente ogni anno per i cani anziani – dai 10 anni di età in su).

F. A proposito del vaccino lepto, tutte le linee guida e anche la dichiarazione di consenso espressa da BSAVA (2015), suggeriscono il ricorso al vaccino tetravalente. Inoltre, va ricordato che bivalente richiama bivalente; L-multi (trivalente) richiama L-multi; tetravalente richiama tetravalente. Inizio di vaccinazione può essere anticipato (leggi foglietti illustrativi).

G. Il vaccino rabbia può essere triennale dal momento della prima somministrazione, oppure dopo il primo richiamo all'anno di età. Alcuni vaccini sono ancora annuali.

H. IN: intranasale; P: parenterale; Os: orale. Il vaccino orale contiene solo *B. bronchiseptica*, va somministrato in singola dose dalle 8 settimane e poi richiamato annualmente.

Esempio di protocollo di vaccinazione gatto (AAFP, 2020; WSAVA, 2016)

Valenza vaccinale ▼	GATTINO ^B			TITOLAZIONE ^C	6-12 mesi ^D	ADULTO
	8 Settimane	12 settimane	16-20 settimane	4 settimane dopo		
Feline Herpes Virus-1 ^A	●	●	●	-	●	Vaccinare non più spesso di ogni 3 anni per FPV Annualità o triennialità per FCV e FHV-1 ^E
Feline Calicivirus ^A	●	●	●	-	●	
Feline Panleukopenia Virus ^A	●	●	●	●	●	
Feline Leukemia Virus ^F	●	●				Annuale o triennale ^G
Rabbia		●				Annuale, biennale o triennale (leggi foglietto illustrativo) ^H

Domenico Russo DVM, PhD

A. Valenze vaccinali CORE, andrebbero somministrate a tutti i gatti.

B. Le linee guida WSAVA (2016), anche per il gattino come per il cane, suggeriscono la chiusura di primo ciclo a 16 settimane di età. La AAFP (2020) suggerisce le 16-20 settimane, in considerazione del fatto che da alcuni studi è emerso che percentuali significative di gattini non si immunizzano verso la panleucopenia a 16 settimane di età.

C. Il test sierologico è utile a determinare lo stato di immunità verso la FPV, poiché il titolo anticorpale correla bene con la protezione. La correlazione tra anticorpi sierici circolanti e protezione contro l'infezione da FCV e FHV-1 è meno robusta. Il test va eseguito 4 settimane dopo l'ultima dose vaccinale di primo ciclo.

D. Richiamare le valenze core a partire dai 6 mesi di età, offre l'opportunità di immunizzare quei gattini che avevano ancora anticorpi materni interferenti al momento dell'ultima dose vaccinale.

E. Outdoor annuale, indoor triennale.

F. Il vaccino FeLV è considerato core in tutti i gatti che hanno meno di 1 anno di età dalla AAFP (2020), le linee guida WSAVA ritengono che questo vaccino sia da considerarsi non core, valutando di volta in volta le circostanze in cui ne è indicata la somministrazione.

G. I vaccini FeLV inattivati e adjuvati offrono la possibilità di vaccinazione triennale nei gatti che hanno uno stile di vita a basso rischio di contagio.

H. Il vaccino anti-rabbia può avere doi triennale a decorrere dal momento di prima somministrazione (dalle 12 settimane di età), oppure doi triennale, biennale o annuale a partire dal primo richiamo effettuato un anno dopo la vaccinazione di base.